

TAKARMÁNYRÉPA VETŐMAG

FELHASZNÁLÁS:

- növendék szarvasmarhák és tehének takarmányozására

ETETHETŐ MENNYISÉGE:

- receptúrától függően max. 10kg/tehén/nap*

ELŐNYEI:

- magas energia és cellulóztartalom
- magas cukortartalom (szárazanyagának 35-40%-a szacharóz)
- természetes energiaforrás
- nagymértékben csökkenti a szemes kukorica és egyéb gabona felhasználását
- könnyű emészthetőség
- laktagóg hatás
- növeli a tej beltartalmát
- kis helyet foglal a bendőben
- tárolása egyszerű, szalmabála depóban is történhet
- takarmányozási előkészítést nem igényel, közvetlen az etetőkocsiba rakható**

TERMESZTÉSTECHNOLÓGIA:

- Talajelőkészítés: kertszerűen elmunkált, aprómorzás, kellően ülepedett, egyenletes felületű magágy
- Vetési idő: március vége - április eleje
- Vetőmag dózis: 1,8 - 2 „U”egység
- Vetésmélység: 3-4 cm, egyenletes mélységű vetőágy
- Tápanyagellátás: megegyezik a cukorrépáéval
- Növényvédelem: sok lehetőség van, pl.
 - alapkezelés: Duál Gold 960 EC: 1,6 - 1,9 l/ha
 - állománykezelés: Betanal Expert:1 l/ha + Goltix 1 kg/ha
- A sorközművelést nagyon meghálálja. A júniusi levélborulásig kétszeri sorközművelést ajánlunk.
- Betakarítás: a szélső levelek sárgulásakor kell elkezdeni, először a fejezéssel, majd a répatest kiemelésével. A kiemelés után célszerű hagyni, hogy a föld végén sáncokba rakva „kipipálja” magát, mivel a parásodott, lehűlt répa könnyebben tárolható. Optimális szedési időpont: szeptember – október (az esős időszak előtt).

*Túletetése acidosist okozhat, a rostbevitelre fokozottan ügyeljünk.

** A felhasználás során egy esetben sem fordult elő nyelőcső-eltömődés, vagy földes szennyeződésre visszavezethető, clostridium okozta megbetegedés.