

# TAKARMÁNYNÖVÉNY-VETŐMAGOK

● PERJE VETŐMAGOK ÉS FŰKEVERÉKEK

GMO-  
MENTES  
FEHÉRJEFORRÁS



## TAKARMÁNYUGAR

TÖBB ÉVES KASZÁLÓKULTÚRA

### FELHASZNÁLÁS

- szenázs vagy széna készítése

### ÖSSZETÉTEL

- lucerna
- csomós ebír
- angolperje

### KISZERELÉS

15 kg-os zsákban

### ELŐNYEI

- Egyszerűen fenntartható kaszálótársulás.
- Növeli a biodiverzitást.
- Átlagos évben három alkalommal kaszálható.
- A nagy pillangós arány javítja a talajéletet, a fűfélék pedig a talajszerkezetet.
- A takarmány készítése széna és szenázs esetében is egyszerűbb, mint a tiszta vetésű pillangósoknál.
- Könnyen természetes, olcsó takarmányt ad mindenféle kérődző állat számára.
- Kiegyensúlyozott energia- és fehérjetartalommal bír.



SERSIA FARM



INTEGREN

SERSIAFARM Kft. • INTEGREN • 06 26 338 129

www.sersiafarm.hu • info@sersiafarm.hu



# TAKARMÁNYUGAR **TERMESZTÉSTECHNOLÓGIA**



<b>Vetés ideje</b>	február-április, szeptember
<b>Vetés mélység</b>	0,5-1 cm
<b>Vetőmagigény</b>	25 kg/ha
<b>Betakarítás</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• A vetés évében az első kaszálás vagy szárzúzás 8-10 cm-es tarlóval történjen, így az oldalhajtásokat növekedésre serkentjük.</li><li>• Későbbi kaszálásokkor is kerüljük a „borotválást”; 4-5 cm-es tarló mindenképp szükséges.</li><li>• Száraz évjáratú telepítéskor mechanikai gyomirtási céllal mindenképp szükséges egy szárzúzás az első kaszálás helyett!</li><li>• A parlagfüves állományt július 1. előtt mindenképp kaszálni vagy zúzni kell!</li></ul>
<b>Növényvédelem</b>	Biodiverzitás szegélyeken vegyszeres gyomirtást nem alkalmazhatunk!
<b>Egyéb</b>	Célszerű olyan helyekre telepíteni, ahol domborzati vagy egyéb okok miatt az éven belüli többszörös szántóföldi művelés gondot jelent.

